

پیام های دارویی

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو مرکز ثبت و گزارش عوارض داروها



- 1 - بیمار باید مطابق دستور پزشک داروی خود را به مقدار تجویز شده مصرف نماید.
- 2 - مصرف غیرمنطقی و خودسرانه دارو، نه تنها موجب درمان بیماری نمی شود، بلکه باعث ایجاد عوارض دارویی در طولانی مدت نیز می‌گردد.
- 3- ظرف محتوی دارو را از نظر مشخصات دارو (نام، دوزاژ و فواصل تجویز) چک کنید.
- 4- دارو را در درجه حرارت توصیه شده توسط کارخانه سازنده، نگهداری نمایید.
- 5- داروها را از دسترس اطفال دور نگهدارید .
- 6- داروها را دور از نور خورشید و حرارت نگهداری نمایید.
- 7- در صورت بروز علائم جدید ناشی از مصرف دارو ، پزشک را مطلع سازید .
- 8- داروها را با دوزاژ توصیه شده به کار برید.
- 9- از خود درمانی با داروها پرهیز نمایید.
- 10- در تجویز داروها به سالمندان دقت نمایید.
- 11- دوره درمان را کامل کنید.
- 12 - زمانی که شما آنتی بیوتیک را به صورت صحیح و منطقی مصرف میکنید بهترین کار را برای سلامت خود ، خانواده و اطرافیان انجام داده اید .
- 13 - آنتی بیوتیک ممکن است باعث شود تاثیر قرصهای خوراکی جلوگیری از بارداری کم شود ، چه بسا در طول دوره درمان با آنتی بیوتیک استفاده از روشهای دیگر ضد بارداری لازم باشد که در این موارد باید از داروساز یا پزشک مشاوره بگیرید .
- 14 - بی شک بروز مقاومت های میکروبی تهدید جدی برای حیات بشری است ف علت ان عمدتا ناشی از :
استراتژی غلط بشر در مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در حوزه درمان ، دامپزشکی ، دام پروری ، کشاورزی و صنعت است . منطقی نمودن تجویز و مصرف آنتی بیوتیک ها در حوزه درمان و محدودیت استفاده غیر انسانی از این داروها تنها راه مقابله با این پدیده شوم می باشد .